

仅供科研使用

版本号：B 版

尼氏染色液（焦油紫法）

【货号】 BP-DL695

【规格】 2×50mL

【保存】 10~30°C，避光，12 个月。

【产品组成】

Component	2×50mL	Store at
试剂（A）:焦油紫染色液	50mL	10~30°C，避光
试剂（B）:分化液	50mL	10~30°C

【产品简介】

神经元细胞体包括一个具有皱褶核膜的大细胞核、稀疏的染色质和一个明显的核仁。在细胞体中细胞质是尼氏颗粒，即能够代表粗面内质网并在很多神经元中产生特异的斑点状嗜碱性表现的嗜碱性颗粒。尼氏颗粒可以用很多染色来显示如中性红、亚甲基蓝、甲苯胺蓝和甲基紫等。染色的变异、pH 和分化的时间使一些染色既可以仅突出尼氏物质，也可以显示神经元的细胞核和神经胶质。尼氏体（Nisslbody）或称尼氏小体是分布于神经细胞胞质内的三角形或椭圆形小块状物质，能被碱性染料如硫堇、亚甲蓝、甲苯胺蓝和焦油紫等染料染成紫蓝色。各种神经细胞内都含有尼氏体，但其形状、数量、分布位置常常不同。尼氏体也存在于树突中，但不在于轴突和胞体的轴丘中。尼氏体会因为生理状态的变化而变化，尼氏体是神经元内合成蛋白质的重要部位，当神经元受到刺激后，胞体内的尼氏体会明显减少。

尼氏染色液（焦油紫法）主要特点是操作简便、染色稳定、适用范围广，可以用于石蜡组织切片的尼氏物质、神经元等的染色，尼氏体的存在和消失是神经细胞是否受损的重要指标，当发生脑炎、脑缺血、轴突反应等情况时，尼氏体会发生溶解甚至消失。

联系地址：南京市江宁区天元东路 2289 号 5 号楼 B 座 2F

联系电话：400-878-7820

【使用方法】

- 1、固定:新鲜组织可采用乙醇、Carnoy 固定液或中性福尔马林溶液，常规脱水包埋。
- 2、组织切片:石蜡切片 6~8 μ m。切片常规脱蜡至水。
- 3、入焦油紫染色液 37 $^{\circ}$ C 下温箱浸染 1~3h（或 56 $^{\circ}$ C 温箱浸染 1h）。
- 4、冷却后蒸馏水冲洗。
- 5、用分化液分化 10s~2min（需在显微镜下观察至背景接近于无色为止）。
- 6、无水乙醇迅速脱水。二甲苯透明，中性树胶封固。

【染色结果】

尼氏物质或尼氏小体	紫色
背景	接近于无色或浅蓝色

【注意事项】

- 1、尼氏体离体后容易溶解，所以组织取出后应立即固定，否则难以着色。
- 2、组织固定起着非常重要的作用，可采用乙醇、Carnoy 固定液或中性福尔马林溶液。
- 3、本染色液对石蜡组织切片的尼氏染色效果较好。
- 4、石蜡切片厚度可能会影响染色效果，需根据组织情况调整切片厚度。
- 5、染色后的标本务必避光保存，否则容易褪色。
- 6、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。